

Instrucciones de pretratamiento para cosméticos inyectables

Para BOTOX® cosmético, XEOMIN® y rellenos dérmicos:

- Aproximadamente de 7 a 10 días antes del procedimiento, evite los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, Advil®, Motrin®, Nuprin®, Aleve®, Celebrex®, aceite de pescado, Ginkgo Biloba, hierba de San Juan y altas dosis de vitamina E, ya que pueden aumentar el riesgo de hemorragia y hematomas en los sitios tratados. Se permiten multivitaminas y Tylenol® (si no están contraindicados).
- Evite las bebidas alcohólicas durante las 24 horas previas al procedimiento, ya que esto puede aumentar el riesgo de hemorragia y hematomas en los sitios tratados.
- Evite depilarse, decolorarse, depilarse con pinzas y el uso de cremas depilatorias en las áreas a tratar.
- Dado que la piel quemada por el sol es difícil de tratar, evite la exposición al sol.
- Coma una comida pequeña o un refrigerio antes de su cita. Esto disminuirá la posibilidad de sufrir mareos durante su tratamiento.
- Informe siempre a su médico de todos los medicamentos y suplementos que esté tomando, así como de su historial médico.
- Vuelva a programar su cita con al menos 24 horas de anticipación si tiene sarpullido, llagas alrededor de la boca o imperfecciones en el área.
- Si tiene antecedentes de llagas alrededor de la boca, infórmeselo a su proveedor. Es posible que le receten un medicamento antiviral antes del tratamiento.
- Venga a su cita con la cara limpia. No use maquillaje ni humectantes el día de su visita.

Instrucciones adicionales para rellenos dérmicos:

- Evite los procedimientos dentales (incluidas las limpiezas) 2 semanas antes del relleno y 2 semanas después del relleno.
- Los moretones y la hinchazón empeorarán durante las primeras 24 a 48 horas después de recibir las inyecciones de relleno dérmico. Evite hacer ejercicio durante el resto del día siguiente a la inyección (o inyecciones). Es posible que desee abstenerse de asistir a eventos especiales durante este tiempo.
- Si está tomando anticoagulantes recetados como Coumadin®, aspirina o Plavix®, debe consultar con el médico prescriptor para ver si puede suspender estos medicamentos durante 7 a 10 días antes de su cita y al menos 2 días después de realizado el procedimiento.
- Puede tomar Tylenol® (si no está contraindicado) una hora antes de su cita para evitar cualquier molestia que pueda experimentar.